



Azodrín®

MONOCROTOFOS
INSECTICIDA/ACARICIDA - LÍQUIDO MISCIBLE

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

% EN PESO

Ingredientes Activo

Monocrotofos

(Dimetil (E)-1-metil-2-(metil carbamoil) vinil fosfato).....No menos de 56.00

Ingredientes Inertes:

Diluyente y antricristalizante.....No más de 44.00

Total.....100%

REG: RSCO-INAC-0149-334-012-056



MORTAL EN CASO DE INGESTIÓN O INHALACIÓN

Azodrín® es un insecticida/acaricida organofosforado sistémico, de amplio espectro, que actúa por contacto e ingestión, para el control de insectos chupadores, gusanos defoliadores, barrenadores, gusanos de fruto, araña roja. Interfiere en la transmisión de los impulsos nerviosos por la inhibición de la acetilcolinesterasa.

Para el control de plagas en los cultivos, al detectar las primeras poblaciones de los insectos o ácaros seguir las siguientes recomendaciones.

CULTIVOS AUTORIZADOS

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (L/Ha)
Algodonero (21)	Pulgón (<i>Aphis gossypii</i>), Chinche manchadora (<i>Dysdercus spp</i>), Mosquita blanca (<i>Bemisia tabaci</i>), Pulga saltona (<i>Pseudotomocelis seriatus</i>), Gusano medidor (<i>Alabama argillacea</i>), Gusano falso medidor (<i>Trichoplusia ni</i>), Gusano rosado (<i>Pectinophora gossypiella</i>), Gusano peludo (<i>Estigmene acrea</i>), Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>), Picudo del algodón (<i>Anthonomus grandis</i>), Araña roja (<i>Tetranychus spp</i>).	0.5- 1.5
Caña de azúcar (30)	Barrenador del tallo (<i>Chilo spp</i>), Barrenador del maíz (<i>Diatraea grandiosella</i>), Barrenador occidental (<i>Diatraea considerata</i>), Chinche de encaje (<i>Leptodyctia tabida</i>), Mosca pinta (<i>Aeneolamia postica</i>), Pulgón amarillo (<i>Sipha flava</i>).	1.0 -1.5
Cacahuete (21)	Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>), Gusano falso medidor (<i>Trichoplusia ni</i>), Doradilla (<i>Diabrotica spp</i>).	1.0
Jitomate y Tomate de cáscara (21)	Pulgón myzus (<i>Myzus persicae</i>), Mosquita blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), Chicharrita (<i>Empoasca spp</i>), Pulga saltona negra (<i>Epitrix spp</i>), Gusano falso medidor (<i>Trichoplusia ni</i>), Gusano del fruto (<i>Heliothis zea</i>), Gusano del cuerno (<i>Manduca sexta</i>), Trips de las flores (<i>Frankliniella tritici</i>).	0.5 - 1.5
Papa (7)	Pulgón (<i>Macrosiphum euphorbiae</i> (solanifolii)), Palomilla de la papa (<i>Phthorimea operculella</i>), Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>), Gusano falso medidor (<i>Trichoplusia ni</i>), Mosquita blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), Pulga saltona (<i>Epitrix spp</i>).	1.0-1.5
Soya (5)	Chinche Ligus (<i>Lygus spp</i>), Doradilla (<i>Diabrotica balteata</i>), Chinche verde (<i>Nazara viridula</i>), Gusano de la vaina (<i>Heliothis zea</i>), Gusano falso medidor (<i>Pseudoplusia includens</i>), Gusano terciopelo (<i>Anticarsia gemmatilis</i>), Trips negro (<i>Caliothrips phaseoli</i>).	0.5-1.0
Tabaco (5)	Gusano de la yema (<i>Heliothis virescens</i>), Gusano del cuerno (<i>Manduca sexta</i>), Gusano falso medidor (<i>Trichoplusia ni</i>), Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>), Gusano peludo (<i>Estigmene acrea</i>), Mosquita blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), Picudo del tabaco (<i>Trichobaris championi</i>), Pulga saltona (<i>Epitrix spp</i>).	1.0 -1.75

()= Intervalo de seguridad; termino en días, desde la última aplicación y la cosecha.
Tiempo de reentrada a los campos tratados: 24 hrs.

RECOMENDACIONES AL APLICADOR

Durante el manejo de este producto use el equipo de protección adecuado: gorra de algodón, o sombrero; mascarilla, gafas, overol de algodón, guantes y botas de hule.

MÉTODO PARA PREPARAR Y REALIZAR LA APLICACIÓN

Utilizando el equipo de protección personal y con el equipo de aspersión calibrado, llenar el tanque de mezcla hasta $\frac{3}{4}$ de su capacidad con agua limpia. Agregar **Azodrin®**, a la dosis recomendada y complete la capacidad del tanque, sin dejar de agitar. Se sugiere utilizar un volumen de agua por hectárea de 200 a 400 L para aspersiones terrestres; de 40 a 60 L en aspersiones aéreas con equipo convencional ó 25 a 30 L con equipo Micronair. La mezcla debe ser aplicada el mismo día, durante las primeras horas de la mañana.

En caso de mezcla con otros agroquímicos autorizados, agregue estos primero al tanque de aspersión y **Azodrin®** después, pero siempre antes de algún producto formulado como concentrado emulsionable. Mantenga la agitación de la mezcla.

CONTRAINDICACIONES

No aplicar cuando exista calor y la velocidad del viento sea moderada, arriba de 6 km/hr por hora.

RESIDUALIDAD DEL PRODUCTO: De 3 a 8 días

INCOMPATIBILIDAD

No mezclar con productos de fuerte reacción alcalina. Si existen dudas, se recomienda hacer una pre mezcla para asegurar la compatibilidad física de los productos y así disminuir el riesgo de fitotoxicidad.

FITOTOXICIDAD

Este producto no es fitotóxico a la dosis y en los cultivos aquí recomendados empleándose como se estipula en esta etiqueta.

MANEJO DE RESISTENCIA

PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LA DOSIS Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO ALTERNANDOLO CON OTROS GRUPOS QUIMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCION Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACION Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.

TOXICIDAD

Este producto es un organofosforado, pertenece al grupo de Inhibidores de la acetilcolinesterasa.



SUSTANCIA POTENCIALMENTE PELIGROSA AL MEDIO AMBIENTE

**EN CASO DE INTOXICACIÓN POR AGROQUÍMICOS
LLAMAR AL CENTRO DE ATENCIÓN A INTOXICACIONES (ATOX) 01 800 000 2869
ATENCIÓN 24 HORAS, 365 DÍAS DEL AÑO.**

Azodrin® se envasa en presentaciones de 950 mL

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTE A SU INGENIERO AGRÓNOMO ASESOR.

NAY-CHEM, S.A. de C.V. solamente se responsabiliza de la formulación correcta y el contenido neto del producto. Dado que el manejo, transporte, almacenaje, dosificación y aplicación de los productos, están fuera de nuestro control, NAY-CHEM, S.A. de C.V. no se hace responsable del uso y resultado de los mismos.