



## NUTRIENTE VEGETAL REGULADOR DE CRECIMIENTO TIPO 1 - LÍQUIDO

### COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Citoquininas (5000 ppm)

### % EN PESO

0.5

**REG: RSCO-370/VIII/23**

**CITOCELL®** es un producto basado en la hormona natural Citoquinina la cual promueve la división y diferenciación celular para formar hojas, flores y frutos en los cultivos. Además interviene en la formación de yemas laterales, el amarre y crecimiento de frutos.

### RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVOS	DOSIS	ÉPOCA DE APLICACIÓN
Solanáceas: Berenjena, Chile, Tomate.	250 mL/Ha	Aplicar desde los 30 a 45 días después de que la planta emergió, prosiga con las aplicaciones cada 8 a 15 días para promover una producción continua.
Cucurbitáceas: Calabaza, Melón, Pepino, Sandía.	250 mL/Ha	Aplicar al inicio de la floración, continuando con intervalos de 8 a 15 días.
Leguminosas: Cacahuate, Frijol, Garbanzo, Haba, Soya.	250 mL/Ha	Iniciar aplicaciones cuando la planta tenga de 4 a 6 hojas, continuar al inicio de la floración y repetir cada 8 a 15 días después.
Gramíneas: Avena, Arroz, Trigo, Cebada, Centeno, Maíz, Sorgo.	250 mL/Ha	Aplice cuando las plantas tengan de 4 a 5 hojas, repetir cada 15 días.
Crucíferas: Brócoli, Col, Coliflor.	250 mL/Ha	Aplice cuando las plantas tengan de 4 a 6 hojas verdaderas y realice una aplicación a los 15 días después.
Asteráceas: Lechuga.	250 mL/Ha	Aplice cuando las plantas tengan de 4 a 6 hojas verdaderas y realice una aplicación a los 15 días después.
Tubérculos y raíces: Betabel, Camote, Jícama, Papa, Zanahoria.	250 mL/Ha	Aplice al inicio de la formación del tubérculo o raíz y repita aplicando cada 15 días.
Frutales: Aguacate, Cafeto, Piña, Ciruelo, Cítricos, Guayabo, Mango, Manzano, Papaya, Plátano.	1 ml / L de agua	Aplice al inicio de la floración, repita a los 15 días después; posteriormente aplique cada mes durante el desarrollo de frutos.
Berries: Arándano, Frambuesa, Zarzamora	250 mL/ha	Primera aplicación 20 días después de la brotación; 2da aplicación al inicio de la floración.

## MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Al manipular el producto utilice el equipo de protección personal necesario. Agite bien antes de abrir el envase. El envase debe abrirse en el lugar de la aplicación, quite con las manos la rosca de seguridad o sello de garantía, en caso de que se requiera medir cantidad de producto menor a la presentación de 1L, se recomienda medir la dosis de aplicación con algún instrumento graduado (probeta).

Calibre siempre su equipo de aplicación, vierta el producto a la dosis recomendada, directamente en el agua de aspersión, agitando levemente. Realice la aplicación por la mañana procurando cubrir bien el follaje, **CITOCCELL®** puede ser empleado dentro de un programa de fertilización y/o fitosanitario, agregándolo primero al tanque de aspersión.

En un recipiente realice una pre mezcla del producto con un poco de agua, agregue la cantidad de **CITOCCELL®** a utilizar, agite y vacíe la pre mezcla en el tanque del equipo aspersor o tanque de mezclado de fertilizantes y llene con la cantidad de agua necesaria.

Realice la aplicación por la mañana procurando cubrir bien el follaje, **CITOCCELL®** puede ser empleado dentro de un programa de fertilización y/o fitosanitario, agregándolo primero al tanque de aspersión.

## COMPATIBILIDAD

**CITOCCELL®** es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común, sin embargo, se recomienda hacer una prueba de compatibilidad antes de usarse.

## FITOTOXICIDAD

**CITOCCELL®** no es fitotóxico, aplicado en los cultivos indicados y a las dosis recomendadas en esta etiqueta.

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Al emplear **CITOCCELL®** no se requiere equipo de protección especial, por ser poco tóxico, sin embargo, al utilizarse en mezcla con otros productos, se recomienda leer las indicaciones particulares de los mismos con que se mezcle.

### Siga estas recomendaciones

1. NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO.
2. NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS O ROPA.
3. MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
4. LÁVESE LAS MANOS DESPUES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.
5. NO SE INGIERA Y EVITE EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON LOS OJOS Y LA PIEL.

**EN CASO DE PRESENTAR MOLESTIAS POR EL CONTACTO CON EL PRODUCTO CONSULTAR CON EL MÉDICO**

**CITOCCELL®** se envasa en presentaciones de 250 mL, 1 y 20 L.

**PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTE A SU INGENIERO AGRÓNOMO ASESOR.**

NAYCHEM MEXICANA S.A. de C.V. solamente se responsabiliza de la formulación correcta y el contenido neto del producto. Dado que el manejo, transporte, almacenaje, dosificación y aplicación de los productos, están fuera de nuestro control, NAYCHEM MEXICANA S.A. de C.V. no se hace responsable del uso y resultado de los mismos.