FICHA TÉCNICA

AGROKORITA
SU CULTIVO EN BUENAS MANOS

HUMICO 12

FERTILIZANTE ÓRGANO-MINERAL LÍQUIDO

COMP. GARANTIZADA	% P/P
Ácido Húmico	6.96
Ácido Fúlvico	5.04
Nitrógeno (N)	0.47
Fósforo (P)	0.47
Potasio (K_2O)	0.37
Hierro (Fe)	0.43

COMP. GARANTIZADA	% P/P
Magnesio (Mg)	0.24
Zinc (Zn)	0.23
Manganeso (Mn)	0.18
Boro (B)	0.14
Molibdeno (Mo)	0.09

REGISTRO: RSCO-0096/VI/00

RECOMENDACIÓN DE APLICACIÓN

CULTIVOS	DOSIS / HA	ÉPOCA DE APLICACIÓN
Brócoli, Cebolla, Chile, Coliflor, Fresa, Lechuga Melón, Sandia, Tomate (Jitomate), Zanahoria.	70- 90 L (por ciclo)	En el FERTIRRIEGO, según este programa: a). 10 ml/L de agua. En el plantero: Asperjar a la base de la plántula. b). 10 a 20 L /ha. Una semana después del trasplante c). 10 a 15 L /ha. En cada fertilización
	2-4 L	En ASPERSION FOLIAR, en mezcla con insecticidas, fungicidas o fertilizantes foliares.
Arroz, Maíz, Trigo.	15 -45 L (por ciclo)	En mezcla con fertilizantes líquidos, aplicando 5 L / ha / semana, según necesidades.
Jícama, Papa.	Según tratamien-to	a). En inmersión: 1-2 L /100 L de agua. b). En el fondo del surco: 5-10 L /100 L en mezcla con productos fitosanitarios. c). En el fertirriego: 5-7 L /ha a las 3 a 4 semanas después de emergido y al inicio de la tuberización.
Aguacate, Berries (Arándano, Frambuesa, Zarzamora), Cítricos (Limón, Naranja, Toronja), Mango, Manzana, Papaya, Peral, Vid.	15-30 L	En el agua de riego (rodado, aspersión, goteo).Durante las etapas críticas del desarrollo del cultivo: germinación, desarrollo vegetativo, floración, amarre de fruto y desarrollo del mismo, en mezcla con fertilizantes.
	1-3 L	Al follaje en mezcla con agroquímicos.

FORMAS DE PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Antes de abrir el envase, agítese. Ya con el equipo de aplicación calibrado, en aplicación al suelo o en aspersión al follaje, mezclar la cantidad recomendada de HUMICO 12 en un poco de agua; verter la mezcla en el tanque, agitando levemente. Incorpore después los fertilizantes o plaguicidas según sea el caso.

CONTRAINDICACIONES

No aplicar en horas de calor intenso, ni cuando el viento sea superior a 6 km por hora. No lo exponga a la luz del sol directa.

COMPATIBILIDAD

HUMICO 12 puede ser mezclado con otros productos dentro de un programa de fertilización y/o fitosanitario, previamente diluidos en un poco de agua. No mezclar con Nitrato de Calcio, con poli fosfatos, sulfato de fierro o zinc ni con productos ácidos. HUMICO 12 no es fitotóxico, aplicado en los cultivos indicados y a las dosis recomendadas en esta etiqueta.

MEDIDAS PARA PROTECCION AL AMBIENTE

- RESPETE LAS RECOMENDACIONES DE USO DEL PRODUCTO.
- MANEJE EL ENVASE VACIO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN SU LOCALIDAD.
- RESPETE LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS.
- NO TIRE LOS ENVASES O EMPAQUES VACIOS DEL PRODUCTO EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA.
- NO VIERTA EL REMANENTE DEL PRODUCTO O AGUA DE LAVADO DEL EQUIPO DE APLICACIÓN, EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA.
- RESPETE LAS DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO.

HUMICO 12 se envasa en presentaciones de 1, 20, 200 y 1000 L

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTE A SU INGENIERO AGRÓNOMO ASESOR.

NAY-CHEM, S.A. de C.V. solamente se responsabiliza de la formulación correcta y el contenido neto del producto. Dado que el manejo, transporte, almacenaje, dosificación y aplicación de los productos, están fuera de nuestro control, NAY-CHEM, S.A. de C.V. no se hace responsable del uso y resultado de los mismos.