FICHA TÉCNICA

AGROKORITA
SU CULTIVO EN BUENAS MANOS

Kuranyl

FUNGICIDA - SUSPENCIÓN CONCENTRADA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA	% EN PESO
Ingrediente(s) Activo(s)	
Pirimetanil N-(4,6-dimetilpirimidin-2-il)anilina (Equivalente a 400 g de I.A / L)	**36.40**
Difenoconazol 3-cloro-4-[(2RS,4RS; 2RS,4SR)-4-metil-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)-1,3-dio-xolan-2-il]fenil 4-clorofenil éter (Equivalente a 100 g de i.a. /L)	**9.10**
Ingredientes inertes Anticongelante, Dispersante, Humectante/Dispersante, Agente tixotrópico, Preserverante, Antiespumante, Espesante y Medio dispersante.	**54.50**
Total	**100%**

REGISTRO: RSCO-MEZC-FUNG-0301G-0375-X0030-064-45.5

NOCIVO SI SE INHALA.

Kuranyl es un fungicida a base de Pirimetanil y Difenoconazol para el control preventivo y curativo de enfermedades fungosas en los cultivos agrícolas.
Pirimetanil pertenece al grupo químico de las Anilinopirimidinas; modo de acción Frac Code 9. Posee actividad translaminar en el follaje. Actúa impidiendo la extensión del tubo germinativo de la espora infectiva del hongo, deteniéndose así la penetración en las células del cultivo.
Difeconazol pertenece al grupo químico de los Triazoles; modo de acción Frac Code 3. Actúa por contacto y sistémicamente teniendo función preventiva y erradicante. Es inhibidor de la síntesis del ergosterol en las membranas celulares de los hongos deteniendo el desarrollo del tubo germinativo y crecimiento micelial.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVOS	PATÓGENO	DOSIS	OBSERVACIONES
Berenjena, Chile, Jitomate, Papa, Tomate de cascara (1)	Tizón temprano *Alternaria solani*	1.0 - 1.25 L / Ha	Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días cuando se detecten los síntomas de la enfermedad; volumen de aplicación 430-530 L de agua /ha.
Manzano, Membrillo, Níspero, Peral (7)	Roña *Venturia inaequalis*	400-500 mL/ha	Realizar tres aplicaciones al follaje a intervalos de 8 días cuando se detecten los síntomas de la enfermedad; volumen de aplicación 750-850 L de agua /ha.
Manzano, Membrillo, Peral (7)	Cenicilla *Podosphaera leucotricha*	800-1500 mL/ha	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalos de 14 días cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad; volumen de aplicación sugerido 950 -1050 L de agua/ha.
	Corazón mohoso *Alternaria alternata*	550-700 mL/ha	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalos de 7 días en etapa de floración; volumen de aplicación sugerido 950-1050 L de agua /ha.
Banano (7)	Sigatoka *(Mycosphaerella fijiensis)*	400-600L/ha	Realizar 3 aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días, iniciar las aplicaciones cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad; volumen de aplicación 480-580 L de agua/ha.
Arándano ,Frambuesa, Fresa, Grosella, Vid, Zarzamora (14)	Moho gris *Botrytis cinerea*	1.25-1.75 L/ha	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalos de 7 días cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad y se presenten las condiciones favorables para su desarrollo; volumen de aplicación sugerido 550-650 L de agua /ha.

AGROKORITA
SU CULTIVO EN BUENAS MANOS

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVOS	PATÓGENO	DOSIS	OBSERVACIONES
Ajo, Cebolla, Cebollín (7)	Mancha púrpura *Alternaría porri*	0.75-1.25 L/ha	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalos de 7 días cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad y se presenten las condiciones favorables para su desarrollo; volumen de aplicación sugerido 350-450 L de agua/ha.
Berenjena, Chile, Jitomate, Papa, Pimiento morrón, Tomate de cascara (1)	Cenicilla *Leveilula taurica*	0.6-0.8 L/ha	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalos de 7 días cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad y se presenten las condiciones favorables para su desarrollo; volumen de aplicación sugerido 350-450 L de agua/ha.
Chile, Jitomate, Papa, Pimiento morrón (1)	Mancha foliar *Alternaria alternata*	0.7-1.1 L/ha	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalos de 7 días cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad; volumen de aplicación sugerido 350-450 L de agua/ha.
Calabacita, Calabaza, Chayote, Melón, Pepino, Sandia (3)	Tizón foliar *Alternaria cucumerina*	0.5-0.8 L/ha	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalos de 7 días cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad y se presenten las condiciones favorables para su desarrollo; volumen de aplicación sugerido 350-450 L de agua/ha.
	Cenicilla *Erysiphe cichoracearum*	0.6-0.8 L/ha	
Plátano (7)	Sigatoka negra *(Mycosphaerella fijiensis)*	0.3-0.5 L/ha	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalos de 15 días cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad y se presenten las condiciones favorables para su desarrollo; volumen de aplicación sugerido 550-650 L de agua/ha.

() Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.
Tiempo de reentrada a zonas tratadas: 24 horas después de la aplicación del producto.

FORMAS DE PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Agite bien el envase antes de abrirlo.
Para abrir el envase, quite la tapa rosca girándola en el sentido contrario a las manecillas del reloj y retire el sello de seguridad del envase.
Para mayor precisión mida la cantidad de producto a utilizar con una probeta graduada.
Calibre el equipo de aspersión para aplicar un volumen de agua que asegure una cobertura completa y uniforme del cultivo.
Llene el tanque de mezclado a la mitad de su capacidad, agregue la cantidad necesaria de **Kuranyl**.
Complete con agua hasta el nivel deseado y mantenga la mezcla en constante agitación durante su preparación y aplicación.
En aplicaciones con equipo terrestre se recomienda utilizar un volumen de aplicación de 800 litros de agua por hectárea.

CONTRAINDICACIONES

No aplicar **Kuranyl** cuando la velocidad del viento sea mayor a 8 km/hr cuando se observe que éste sea capaz de arrastrar las gotas de aspersión del producto. Si hay pronóstico de lluvias intensas aplique hasta después de que éstas hayan pasado. No aplicar en horas de excesivo calor.

FITOTOXICIDAD

Kuranyl no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de su etiqueta.

MANEJO DE RESISTENCIAS

PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACION; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNANDOLO CON OTROS GRUPOS QUIMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCION Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACION Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS METODOS DE CONTROL.

NAYCHEM

MANEJO DE RESISTENCIAS

PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACION; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNANDOLO CON OTROS GRUPOS QUIMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCION Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACION Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS METODOS DE CONTROL.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Durante el uso y manejo de este producto, utilice el equipo de protección personal adecuado: overol o camisa de manga larga y pantalón largo de algodón, goggles o lentes para químicos, guantes y botas de neopreno, mascarilla con respirador y delantal industrial. Evite inhalar el producto durante la preparación o aplicación de la mezcla. Llene los recipientes de los equipos de aplicación siempre a favor del viento, evitando derrames. Descontamine el equipo de aplicación lavándolo con detergente o una solución alcalina. Almacenar el equipo de protección en el lugar de trabajo.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE A LA PERSONA CON EL MÉDICO

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA

ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES E INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).

PRESENTACIONES:

Kuranyl se envasa en presentaciones de 1 L

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTE A SU INGENIERO AGRÓNOMO ASESOR.

NAY-CHEM, S.A. de C.V. solamente se responsabiliza de la formulación correcta y el contenido neto del producto. Dado que el manejo, transporte, almacenaje, dosificación y aplicación de los productos, están fuera de nuestro control, NAY-CHEM, S.A. de C.V. no se hace responsable del uso y resultado de los mismos.