FICHA TÉCNICA

AGROKORITA
SU CULTIVO EN BUENAS MANOS

Previstín® PH

FUNGICIDA AGRÍCOLA

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% EN PESO
Ingrediente Activo	**No menos de.....50.00**
Carbendazim Metil benzimidazol-2-il carbamato	
Ingrediente(s) Inerte(s)	**No mas de.....50.00**
Diluyente, humectante, dispersante y compuestos relacionados	

REG.: RSCO-FUNG-0307-002-002-050

NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
NOCIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL.

ESPECTRO DE CONTROL

Previstín® PH tiene acción sobre hongos diversos entre los cuales se incluye Antracnosis, cenicillas, damping off, manchas foliares, fusariosis, pudriciones de raíz o tallo.

MODO DE ACCIÓN

Fungicida con actividad preventiva y curativa, absorbido por la raíces y follaje, traslocado por vía acropétalo.

MECANISMO DE ACCIÓN

Interfiere en la biosíntesis del DNA durante la mitosis y en el mecanismo de trasmisión del mensaje genético del DNA al RNA. Impide el desarrollo de las hifas, la formación de apresorios y el crecimiento del micelio: Afecta también el desarrollo del tubo germinativo de las esporas lo que conlleva irregularidades en la división celular.

CUADRO DE RECOMENDACIONES

¡SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN!

CULTIVOS	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	DOSIS	APLICACIÓN
Frijol (14)	Antracnosis Moho gris Tizón del tallo y vainas	*Colletotrichum lindemuthianum* *Botrytis cinerea* *Diaporthe phaseoionum*	500 g/Ha	Comience las aplicaciones en el inicio de la formación de las vainas, repita 20 días después.
Cacahuate (14)	Antracnosis Mancha de la hoja Moho Gris	*Ascochyta* spp *Cercospora personata* *Cercospora arachidicola* *Botrytis cinérea*	230-250 g/Ha	Comience las aplicaciones al aparecer los primeros sintomas de la enfermedad, repetir a intervalos de 2 semanas.

AGROKORITA
SU CULTIVO EN BUENAS MANOS

CULTIVOS	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	DOSIS	APLICACIÓN
Ornamentales (SL)	Cenicilla Manchas Foliares Mancha negra Moho gris Pudrición de la corteza Pudrición del cuello Damping-off Pudrición radical	*Sphaerotheca* spp *Cercospora* spp, *Phomosis* spp, *Ascochyta chrysanthemi, Septona chrystanthemi* *Diplocarpon rosae* *Botrytis* spp *Thieiaviopsis* spp *Rhizoctonia* spp *Fusantum* spp *Sclerotinia* spp	60-90 g/100 L de agua	Comenzar las aplicaciones a los primeros síntomas, repetir a intervalos de 9 a 14 días.
Soya (SL)	Antracnosis Mancha ojo de rana Moho gris Tizón de tallo y vainas	*Colletotrichum lindemuthianum* *Cercospora sojina* *Botrytis cinerea* *Diaphorte phaseolonum*	500 g/Ha	Comience las aplicaciones en el inicio de la formación de las vainas, repita 20 días después.

(): INTERVALO DE SGURIDAD EN DÍAS, TIEMPO DE ESPERA ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA
SL: SIN LÍMITE.

FORMA DE PREPARAR Y REALIZAR LA APLICACIÓN

Llenar el tanque de aspersión hasta ¾ de su capacidad con agua limpia, agregar Previstín® PH a la dosis recomendada y complete la capacidad sin dejar de agitar.

RECOMENDACIONES AL APLICADOR

Durante el manejo de este producto siempre utilice equipo de protección personal adecuado: overol o camisa de manga larga y pantalón largo (de algodón), guantes de nitrilo, mascarilla, lentes de seguridad y botas de caucho.
No aplicar en horas de calor intenso ni cuando el viento sea superior a 15 km/hora.
No permitir la reentrada a las áreas tratadas hasta que trascurran 24 horas después de aplicado el producto.

TOXICOLOGÍA AL MEDIO AMBIENTE

Este plaguicida es tóxico a peces y organismos acuáticos La deriva y fuga de áreas tratadas, puede ser un riesgo a organismos acuáticos en las áreas aledañas. No aplique directamente al agua, o a aguas superficiales, o en áreas debajo de la marca de la marea.
No contamine el agua cuando elimine el agua del lavado del equipo.

MANEJO DE RESISTENCIA

PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.

Previstín® PH se envasa en presentaciones de 1 Kg.

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTE A SU INGENIERO AGRÓNOMO ASESOR.

NAY-CHEM, S.A. de C.V. solamente se responsabiliza de la formulación correcta y el contenido neto del producto. Dado que el manejo, transporte, almacenaje, dosificación y aplicación de los productos, están fuera de nuestro control, NAY-CHEM, S.A. de C.V. no se hace responsable del uso y resultado de los mismos.

NAYCHEM