FICHA TÉCNICA

AGROKORITA
SU CULTIVO EN BUENAS MANOS

Selectrón

HERBICIDA - CONCENTRADO EMULSIONABLE

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% EN PESO
Ingrediente(s) Activo(s)	**10.50**
Quizalofop-p-etil Etil ®-2-[4-(6-cloroquinoxalin-2-iloxi)fenoxi] propionato (Equivalente a 100 g de i.a./L)	
Ingrediente(s) Inerte(s)	**89.50**
Emulsificante, co solvente y solvente.	
Total	**100%**

REGISTRO SANITARIO: RSCO-HEDE-0262-X0115-009-10.50

NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN

Herbicida sistémico, de aplicación en post-emergencia, formulado como concentrado emulsionable, con penetración/absorción a través de las hojas y las partes aéreas, siendo la traslocación principalmente a través del floema, selectivo a los cultivos de hoja ancha, efectivo en el control de maleza gramínea (poaceas) anuales y perennes.

MODO DE ACCIÓN

Sistémico selectivo a cultivos ya establecidos, tal como papa, agave, rosal y tabaco.

MECANISMO DE ACCIÓN

El Quizalofop-p-etil afecta el metabolismo celular actuando como un inhibidor de la Acetil CoA carboxilasa. Clasificado en el Grupo 1 por HRAC (Herbicide Resistence Action Committee).

CUADRO DE RECOMENDACIONES

¡SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN!

CULTIVOS	MALEZAS		DOSIS	OBSERVACIONES
Papa (SL)	Horquetilla Zacate pata de ganso	*(Paspalum conjugatum)* *(Eleusine multiflora)*	400 a 500 mL/ha	Realizar aplicación total en post emergencia a la maleza y al cultivo, cuando la maleza tenga de 15 a 20 cm de altura .
( ) Intervalo de seguridad, días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. Esperar 12 hrs antes de entrar a los campos tratados.				

RECOMENDACIONES AL APLICADOR

Cuando utilice este producto es importante contar el equipo de protección personal adecuado, el cual consiste en: overol de mangas largas impermeable, guantes de hule, lentes de seguridad, botas de hule, gorra y mascarilla con cartucho.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Con el equipo de protección puesto, agite el producto y abra cuidadosamente el envase. Llene con agua limpia el recipiente del equipo de aplicación, siempre a favor del viento, a 3/4 de capacidad, vierta la cantidad de selectron recomendada e inicie la agitació. complete la capacidad del tanque de aspersión con agua, evitando derrames. Mantener la agitación durante el mezclado y la aplicación al cultivo.

El volumen recomendado es de 300 L/ha.
Realice las aplicaciones en las primeras horas de la mañana o por la tarde.

CONTRAINDICACIONES

No aplicar en horas de calor intenso.
No aplicar cuando haya viento con velocidades mayores a 10 km/h.
No aplicar en presencia de lluvia.
No se recomienda mezclar selectron con otros productos. Si se desea hacerlo, se recomienda mezclar con productos registrados ante la autoridad competente y para el cultivo recomendado, haciendo pruebas de compatibilidad física y fitotoxicidad previa a la aplicación.

MANEJO DE RESISTENCIA

PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.

TOXICOLOGÍA AL MEDIO AMBIENTE

En el suelo es moderadamente persistente, con una vida media de 60 días, siendo más rápidamente la degradación en los suelos con alta actividad microbiana. Tiene buena capacidad de adhesión a las partículas del suelo por lo tanto su movilidad es baja y no se lixivia significativamente. Puede ser absorbido por las plantas, en las cuales se acumula en las partes en continuo crecimiento, tal como ramas y raíces.

ECOTOXICIDAD

Abejas (*Apis mellifera*): Producto no toxico.
Aves: Producto prácticamente no toxico.
Peces e invertebrados actuáticos: Producto extremadamente tóxico.
Plantas acuáticas: Producto tóxico

SELECTRÓN se envasa en presentación de 1 L.

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTE A SU INGENIERO AGRÓNOMO ASESOR.

NAY-CHEM, S.A. de C.V. solamente se responsabiliza de la formulación correcta y el contenido neto del producto. Dado que el manejo, transporte, almacenaje, dosificación y aplicación de los productos, están fuera de nuestro control, NAY-CHEM, S.A. de C.V. no se hace responsable del uso y resultado de los mismos.