



## VIGOR L

### FERTILIZANTE FOLIAR - LÍQUIDO

COMP. PORCENTUAL	% P/V	COMP. PORCENTUAL	% P/V
<b>Nitrogeno Total (N)</b>	<b>114.08 gr/L</b>	<b>Cobre (Cu)</b>	<b>400 mg/L</b>
<b>Fósforo (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)</b>	<b>80.00 gr/L</b>	<b>Hierro (Fe)</b>	<b>500 mg/L</b>
<b>Potasio (K<sub>2</sub>O)</b>	<b>60.00 gr/L</b>	<b>Magnesio (Mg)</b>	<b>250 mg/L</b>
<b>Azufre (S)</b>	<b>2.30 gr/L</b>	<b>Manganeso (Mn)</b>	<b>360 mg/L</b>
<b>Boro (B)</b>	<b>360 mg/L</b>	<b>Molibdeno (Mo)</b>	<b>500 mg/L</b>
<b>Calcio (Ca)</b>	<b>250 mg/L</b>	<b>Zinc (Zn)</b>	<b>800 mg/L</b>
<b>Cobalto (Co)</b>	<b>20 mg/L</b>	<b>Fitohormonas naturales</b>	<b>460 mg/L</b>

**RSCO-0076/IV/00**

**VIGOR L** es un fertilizante líquido para aplicaciones foliares compuesto de nutrientes primarios, secundarios y micro elementos, adicionado con fitohormonas, diseñado para complementar las necesidades nutricionales de los cultivos. **VIGOR L** puede ser aplicado vía foliar de acuerdo a un programa de la nutrición balanceado.

#### RECOMENDACIÓN DE APLICACIÓN

CULTIVOS	DOSIS (L/HA)	ÉPOCA DE APLICACIÓN
<b>HORTALIZAS</b>		
Salanáceas; Berenjena, Chile, Tomate, Papa.	2 a 4 L	Iniciar las aplicaciones en la etapa de plántula en el vivero una semana antes del trasplante, utilizando la dosis baja; continuar con 1 a 2 aplicaciones durante la etapa de desarrollo vegetativo y posteriormente en cada floración, con intervalos de 15 días entre aplicaciones; en Papa realizar 3 aplicaciones con intervalos semanales durante el desarrollo vegetativo.
Cucurbitáceas: Calabaza, Chayote, Melón, Pepino, Sandía.	2 a 4 L	La primera aplicación 15 días después del trasplante a la dosis baja; continuar a dosis alta durante el desarrollo vegetativo y el inicio de la floración.
Leguminosas: Cacahuete, Frijol, Garbanzo, Haba, Jícama, Soya.	2 a 4 L	Iniciar las aplicaciones a los 15 días después de la emergencia y continuar con 1 ó 2 aplicaciones durante el desarrollo vegetativo hasta el inicio de la floración.
Crucíferas: Brócoli, Col, Coliflor.	2 a 3 L	Iniciar con 1 aplicación 15 días después del trasplante a dosis bajas; continuar con 2 aplicaciones a la dosis alta al inicio de la formación de la cabezuela.
Asteráceas: Lechuga.	2 a 4 L	Iniciar con 1 aplicación 15 días después del trasplante a dosis baja; continuar con 2 aplicaciones a la dosis alta al inicio de la formación de la cabezuela.
<b>GRANOS Y FORRAJES</b>		
Gramíneas; Arroz, Avena, Cebada, Centeno, Maíz, Sorgo, Trigo.	2 a 3 L	Realizar 3 aplicaciones con intervalo semanal durante el desarrollo vegetativo o los primeros 45 días del cultivo. En el caso de Avena, Cebada Centeno y Trigo iniciar a la etapa de 5 hojas verdaderas y repetir al embuche.
Alfalfa	2 a 3 L	Realizar las aplicaciones 10 días después de cada corte.

CULTIVOS	DOSIS (L/HA)	ÉPOCA DE APLICACIÓN
<b>ORNAMENTALES</b>		
Crisantemo, Gerbera, Rosal.	20 a 40 cc /L de agua	Aplicar al inicio del desarrollo vegetativo y repetir cada 15 a 21 días.
<b>FRUTALES</b>		
Aguacate, Cítricos (Limón persa, Limón mexicano, Naranja), Mango, Papaya.	200 a 400 cc / 100 L de agua	Iniciar la aplicación en la brotación de yemas; continuar a los 21 días hasta el inicio de la floración; después repetir cada 21 días, incluso en post cosecha.
Berries: Arándano, Frambuesa, Zarzamora	200 a 400 cc / 100 L de agua	Iniciar aplicaciones al inicio del desarrollo vegetativo y durante cada floración.

### FORMAS DE PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Calibre siempre su equipo de aplicación; en un recipiente realice una pre mezcla del producto con un poco de agua, agregue la cantidad de **VIGOR L** a utilizar, agite y vacíe la pre mezcla en el tanque del equipo aspersor y agregar después la cantidad de agua necesaria.

### COMPATIBILIDAD

**VIGOR L** es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común, sin embargo, se recomienda hacer una prueba de compatibilidad antes de usarse. No es compatible con productos de fuerte reacción alcalina.

### FITOTOXICIDAD

**VIGOR L** no es fitotóxico, aplicado en los cultivos indicados y a las dosis recomendadas en esta etiqueta.

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Cuando emplee **VIGOR L**, no requiere equipo de protección especial, por ser de naturaleza poco tóxica, no obstante sí lo utiliza en combinación de otros productos, se recomienda seguir las indicaciones de los mismos durante su mezcla y aplicación.

Siga estas advertencias de seguridad:

1. NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO.
2. NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS O ROPA.
3. MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
4. LÁVESE LAS MANOS DESPUES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.
5. NO SE INGIERA Y EVITE EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON LOS OJOS Y LA PIEL.

**VIGOR L** se envasa en presentaciones de 1L

**EN CASO DE PRESENTAR MOLESTIAS POR EL CONTACTO CON EL PRODUCTO, LLEVE A LA PERSONA CON EL MEDICO.**

**PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTE A SU INGENIERO AGRÓNOMO ASESOR.**

NAY-CHEM, S.A. de C.V. solamente se responsabiliza de la formulación correcta y el contenido neto del producto. Dado que el manejo, transporte, almacenaje, dosificación y aplicación de los productos, están fuera de nuestro control, NAY-CHEM, S.A. de C.V. no se hace responsable del uso y resultado de los mismos.