



**VIGOR 20-30-10** un fertilizante foliar en polvo balanceado a base de Nitrógeno, fósforo y potasio, complementado con nutrientes secundarios y micronutrientes. Diseñado para corregir las deficiencias o cubrir las necesidades de los cultivos por estos elementos nutricionales.

Puede ser usado dentro de un programa de la nutrición balanceado.

### COMP. PORCENTUAL

	% EN PESO
<b>Nitrogeno Total (N)</b>	<b>20.00</b>
<b>Fósforo (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)</b>	<b>30.00</b>
<b>Potasio (K<sub>2</sub>O)</b>	<b>10.00</b>
<b>Nutrientes secundarios y micronutrientes</b>	<b>1.03</b>
Fe (1000 ppm), Mg (1500 ppm), Mo (1200 ppm), Co (1000ppm), Zn (1080 ppm), B (1990 ppm), S (2500 ppm)	
<b>Acondicionadores</b>	<b>38.97</b>
<b>Total</b>	<b>100.00</b>

**RSCO-0454/VIII/99**

## PUEDA SER NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN

### INSTRUCCIONES DE USO SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO

CULTIVOS	DOSIS (Kg/Ha)	ÉPOCA DE APLICACIÓN
Brócoli, Chile, Col, Coliflor, Tomate, Papa.	0.5-1.0	Iniciar las aplicaciones 20 días después de la emergencia. Repitiendo cada 15 días.
Chayote, Melón, Pepino, Sandía.	0.5-1.5	Iniciar las aplicaciones 20 a 30 días después de la emergencia. Repitiendo cada 15 a 20 días.
Fresa.	0.5-1.5	Iniciar aplicaciones cuando el cultivo tenga suficiente follaje posterior al trasplante. Repetir cada 15 días.
Cacahuete, Frijol, Frijol ejotero, Garbanzo, Haba, Soya.	0.5 -1.0	Aplicar 15 días después de la emergencia y durante la formación de la vaina.
Arroz, Avena, Cebada, Centeno, Maíz, Sorgo, Trigo.	0.5 -1.0	2 aplicaciones a los 25 días posteriores a la emergencia, repetir al embuche.
Aguacate, Berries (Arándano, Frambuesa, Zarzamora), Cítricos (Limón persa, Limón mexicano, Naranja), Mango, Papayo, Plátano.	0.3- 0.8	En el vivero cada 30 días; en cultivo establecido en pleno desarrollo, cada 2 meses; durante las etapas de floración y frotación.
Alfalfa.	0.5 -1.0	Diez días después de cada corte.
Algodonero.	0.5 -1.0	Después del "deshije", al inicio del "cuadreo" y a la formación de las bellotas.

### FORMAS DE PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

En un recipiente realice una pre mezcla del producto con un poco de agua, agregue la cantidad de **VIGOR 20-30-10** a utilizar y agite. Vacíe la pre mezcla en el tanque del equipo aspersor y después la cantidad de agua necesaria.

### COMPATIBILIDAD

**VIGOR 20-30-10** es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común, sin embargo, se recomienda hacer una prueba de compatibilidad antes de usarse. No es compatible con productos de fuerte reacción alcalina.

### FITOTOXICIDAD

**VIGOR 20-30-10** no es fitotóxico, aplicado en los cultivos indicados y a las dosis recomendadas en esta ficha técnica.

### SIGA ESTAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD:

1. NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO.
2. NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS O ROPA.
3. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
4. LÁVESE LAS MANOS DESPUES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.
5. NO SE INGIERA Y EVITE EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON LOS OJOS Y LA PIEL.

**EN CASO DE PRESENTAR MOLESTIAS POR EL CONTACTO CON EL PRODUCTO,  
LLEVE A LA PERSONA CON EL MEDICO.**

**VIGOR 20-30-10** se envasa en bolsas de 1 kilo

**PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTE A SU INGENIERO AGRÓNOMO ASESOR.**

NAY-CHEM, S.A. de C.V. solamente se responsabiliza de la formulación correcta y el contenido neto del producto. Dado que el manejo, transporte, almacenaje, dosificación y aplicación de los productos, están fuera de nuestro control, NAY-CHEM, S.A. de C.V. no se hace responsable del uso y resultado de los mismos.